

SANDOZ

# Naproxène Esoméprazole Sandoz®

Le générique de Sandoz  
de l'original Vimovo®




NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

# Indication thérapeutique et utilisation


## Naproxène Esoméprazole Sandoz® pour le traitement symptomatique :<sup>1</sup>



De l'arthrite rhumatoïde



De l'arthrose



De la spondylarthrite ankylosante

- Pour adultes<sup>1</sup>
- 1 comprimé pelliculé 2x par jour<sup>1</sup>  
au moins 30 min avant un repas

### • Mode d'action

Le **naproxène**, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), inhibe les enzymes COX1 et COX2, responsables de la synthèse des prostaglandines. Ces prostaglandines contribuent considérablement aux processus inflammatoires, à la sensation de douleur et à la régulation de la fièvre.<sup>2,3</sup>

L'**esoméprazole**, un inhibiteur de la pompe à proton, qui inhibe les pompes à proton dans la muqueuse de l'estomac et réduit ainsi la production d'acide gastrique. Cela permet d'apaiser les troubles de l'acidité.<sup>4</sup>

1. Information professionnelle Naproxène Esoméprazole Sandoz®. www.swissmedicinfo.ch, mise à jour de l'information: février 2023

2. Vane JR, Mitchell JA, Appleton I, Tomlinson A, Bishop-Bailey D, Croxtall J, Willoughby DA. Inducible isoforms of cyclooxygenase and nitric-oxide synthase in inflammation. Proc Natl Acad Sci U S A. 1994 Mar 15;91(6):2046-50. doi: 10.1073/pnas.91.6.2046. PMID: 7510883; PMCID: PMC43306.

3. Duggan KC, Walters MJ, Musee J, Harp JM, Kiefer JR, Oates JA, Marnett LJ. Molecular basis for cyclooxygenase inhibition by the non-steroidal anti-inflammatory drug naproxen. J Biol Chem. 2010 Nov 5;285(45):34950-9. doi: 10.1074/jbc.M110.162982. Epub 2010 Sep 1. PMID: 20810665; PMCID: PMC2966109.

4. Spencer, C.M., Faulds, D. Esomeprazole. Drugs 60, 321–329 (2000). <https://doi.org/10.2165/00003495-200060020-00006>

# Naproxène Esoméprazole Sandoz® : antirhumatismal avec protecteur gastrique

## Naproxène


- Anti-inflammatoire<sup>1</sup>
- Antalgique<sup>1</sup>
- Antipyrétique<sup>1</sup>



Prise du Naproxène Esoméprazole  
Sandoz® au moins 30 min  
avant un repas.<sup>1</sup>

## Esoméprazole

- Inhibiteur de la pompe à proton<sup>1</sup>





L'esoméprazole inhibe les pompes à proton  
dans la muqueuse de l'estomac.<sup>2</sup>

Cela réduit la quantité d'acide gastrique.  
Cela permet de réduire les troubles  
dus à l'acidité.<sup>2</sup>



1. Information au patient du Naproxène Esoméprazole Sandoz®. www.swissmedicinfo.ch, mise à jour de l'information: février 2023.

2. Spencer, C.M., Faulds, D. Esomeprazole. Drugs 60, 321–329 (2000). <https://doi.org/10.2165/00003495-200060020-00006>.

# Courbe de bioéquivalence du Naproxène Esoméprazole Sandoz®, comprimés pelliculés (à jeun)<sup>1</sup>



# Courbe de bioéquivalence de Naproxène Esoméprazole Sandoz®, comprimés pelliculés (en conditions postprandiales)<sup>1</sup>



1. Données sur fichier



# Disponible dès maintenant : Naproxène Esoméprazole Sandoz®



- Dosage identique à l'original<sup>1</sup>
- Sans gluten<sup>2</sup>
- 10 % de quote-part, pris en charge par les caisses-maladie<sup>1</sup>
- Durée de conservation de 24 mois\*<sup>2</sup>



## Comprimé de Naproxène Esoméprazole Sandoz® 500 mg/20 mg

L'illustration de l'emballage et du comprimé pelliculé ne correspond pas à la taille réelle.

Produit	Conditionnement	Liste	PF (en CHF)	PP (en CHF)	Pharmacode	Code EAN
<b>Naproxène Esoméprazole Sandoz® 500 mg/20 mg</b>	30 comprimés pelliculés	B	8,60	25,75	1124486	 7 680691 840012
<b>Naproxène Esoméprazole Sandoz® 500 mg/20 mg</b>	60 comprimés pelliculés	B	17,20	35,10	1124487	 7 680691 840029

PF = Prix de fabrique (CHF), PP = Prix public (CHF).

\*Après ouverture du récipient en plastique, la durée de conservation des comprimés pelliculés est de 60 jours.

1. Liste des spécialités (LS). [www.spezialitaetenliste.ch](http://www.spezialitaetenliste.ch), mise à jour des informations : 10/2025.

2. Données sur fichier

# Classification des produits Sandoz dans le schéma graduel du traitement de la douleur de l'OMS<sup>1</sup>

## Niveau 1 : douleur légère à modérée

### Non opioïdes

± Mesures de soutien

## Niveau 2 : douleurs modérées

### Opiacés faibles

± Non-opioïdes  
± Mesures de soutien

## Niveau 3 : fortes douleurs

### Opioïdes puissants

± Non-opioïdes  
± Mesures de soutien

Produit

Principe actif

Original

### Niveau 1 : antirhumatismaux non stéroïdiens, analgésiques non opioïdes

#### Naproxène Esoméprazol Sandoz®

Célécoxib Sandoz®

Ecofénac®

Ecofénac® CR

Etoricoxib®

Ibuprofène Sandoz®

Acide méfénomique Sandoz®

Paracétamol Sandoz® éco

#### Naproxène Esoméprazol

Célécoxib

Diclofenac

Diclofenac

Etoricoxib

Ibuprofène

Acide méfénomique

Paracétamol

#### Vimovo®

Celebrex®

Voltaren®

Voltaren®

Arcocia®

Brufen®

Ponstan®

—

### Niveau 2 : opiacés faibles

Tramadol Sandoz®

Tramadol Sandoz® retard

Tramadol

Tramal®

Tramal® Retard

### Niveau 3 : opioïdes puissants

Fentails® patch transdermique

Oxycodone Sandoz®

Oxycodone-Naloxone Sandoz®

Tapentadol Sandoz® Retard

Fentanyl

Oxycodone

Oxycodone/Naloxone

Tapentadol

—

Oxycontin®

Targin®

Palexia® Retard

1. Organisation mondiale de la santé. 1996. Cancer pain relief: with a guide to opioid availability – 2nd ed. Organisation mondiale de la santé



# Naproxène Esoméprazole Sandoz®

## Résumé des caractéristiques du produit

**Naproxène Esoméprazole Sandoz®.** Comprimés pelliculés.

**PA:** Naproxenum, Esomeprazolum ut magnesii esomeprazolum trihydricum. **I:** Traitement symptomatique de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrose et de la spondylarthrite ankylosante chez les patients qui présentent un risque de développer des ulcères gastriques et/ou duodénaux dans le cadre d'une utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et lorsqu'un traitement avec moins de 1000 mg de naproxène par jour n'est pas approprié. **P:** Adultes: 1 comprimé pelliculé 2 fois par jour. Avaler les comprimés pelliculés entiers, au moins 30 minutes avant un repas. Instructions posologiques particulières, voir information professionnelle. **Cl:** Hypersensibilité au naproxène, à l'ésoméprazole, aux benzimidazoles substitués ou à l'un des excipients selon la composition. Antécédents de bronchospasme, d'urticaire ou de symptômes évoquant une allergie après l'administration d'acide acétylsalicylique ou d'autres AINS. Troisième trimestre de la grossesse. Ulcères gastriques et/ou duodénaux actifs ou hémorragies gastro-intestinales. Maladies inflammatoires de l'intestin. Insuffisance hépatique sévère. Insuffisance rénale sévère. Insuffisance cardiaque sévère. Traitement des douleurs postopératoires après une opération de pontage aorto-coronarien. **IA:** Médicaments antirétroviraux, clopidogrel, aspirine, diurétiques, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), IECA/antagonistes du récepteur de l'angiotensine II, lithium, méthotrexate, sulfonylurées, hydantoïnes, anticoagulants oraux, bêtabloquants, tacrolimus, ciclosporine, probénécide, médicaments dont l'absorption dépend du pH gastrique. Autres IA, voir information professionnelle. **EI:** Fréquent: diverticulite, dépression, troubles du sommeil, vertiges, somnolence, céphalées, obnubilation, vertige rotatoire, troubles visuels, acouphène, troubles auditifs, palpitations, dyspnée, dyspepsie, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées, constipation, pyrosis, ulcères peptiques, stomatite, prurit, ecchymoses, purpura, éruption cutanée, épuisement, œdème, sudation, soif, céphalées, douleurs abdominales, constipation, diarrhée, flatulence, nausées, vomissements, polypes des glandes fundiques. Autres EI, voir information professionnelle. **Pr:** Naproxène Esoméprazole Sandoz 500 mg/20 mg: 30 et 60 comprimés pelliculés. **Mise à jour de l'information:** Février 2023 (IPA V01). **Liste Swissmedic:** B. Pour des informations détaillées, voir [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch).

Toutes les références répertoriées peuvent être sollicitées par les spécialistes de Sandoz Pharmaceuticals SA.

**Sandoz Pharmaceuticals SA** Suurstoffi 14, Case postale, 6343 Rotkreuz, Tél. 0800 858 885, Fax 0800 858 888  
[service.sandoz@sandoz.com](mailto:service.sandoz@sandoz.com), [www.sandoz-pharmaceuticals.ch](http://www.sandoz-pharmaceuticals.ch), [www.mysandoz.ch](http://www.mysandoz.ch)

09/2025 CH2509244661

